

ASPIRIN®

Marka Aspirin®

posiada ponad 125-letnią tradycję i jest jednym z najlepiej przebadanych leków na świecie.

Główną substancją czynną jest **kwas acetylosalicylowy (ASA)**, który wykazuje wszechstronne działanie:

- **Przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.**
- **Przeciwzapalne** – w przeciwieństwie do paracetamolu, ASA zwalcza stan zapalny, co jest istotne przy bólach gardła czy mięśni.
- **Przeciwpłytkowe** – hamuje agregację płytek krwi, co wykorzystuje się w profilaktyce sercowo-naczyniowej (dotyczy Aspirin® Cardio, która zawiera 100 mg ASA)



Aspirin® w wielu odstonach – co, kiedy i dlaczego?

1. Aspirin® C oraz Aspirin® C Forte (pierwsze objawy przeziębienia)

- Produkty w formie **tabletek musujących**, łączące ASA z witaminą C.
- **Aspirin® C** (400 mg ASA + 240 mg wit. C): szybko przyswajalna, rozpuszczalna formuła z dodatkiem witaminy C
- **Aspirin® C Forte** (800 mg ASA + 480 mg wit. C): podwójna ilość składników aktywnych (1)



1) W porównaniu do Aspirin C.

Ważna informacja: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

NOWOŚĆ



2. Aspirin® Antigrip Hot (nasilone objawy przeziębienia i grypy, w tym zatkany nos i zatoki)

- **Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej** o smaku pomarańczowym
- **Skład:** 500 mg ASA + 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny
- **Forma podania:** możliwość przygotowania produktu zarówno w zimnej, jak i gorącej wodzie
- **Działanie:** Kompleksowo zwalcza objawy przeziębienia i grypy z niedrożnością nosa i zatok – **udrażnia nos i zatoki, łagodzi ucisk oraz ból głowy.**

3. Aspirin® Musująca oraz Aspirin® (klasyczne formy)

- **Aspirin® Musująca (500 mg ASA):** Szybko przyswajalna, rozpuszczalna formuła na bóle o lekkim i średnim nasileniu oraz gorączkę.
- **Aspirin® (500 mg ASA):** Tradycyjne tabletki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.



4. Aspirin® PRO (szybkość działania)

- Innowacyjna **tabletką powlekana** (500 mg ASA) wykorzystująca opatentowaną technologię **MicroActive®**.
- Posiada **musujący rdzeń**, który pozwala na **6-krotnie szybsze uwalnianie** i **2,5-krotnie szybsze* wchłanianie** substancji czynnej w porównaniu do zwykłych tabletek.
- Maksymalne stężenie w osoczu osiąga już **po około 17,5 minuty.**



Ważna informacja: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Profil bezpieczeństwa ASA – co warto zapamiętać?

Ogólny **profil bezpieczeństwa leku Aspirin®** przy krótkotrwałym stosowaniu w dawkach OTC jest **porównywalny z paracetamolem i ibuprofenem****. Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego jest **rzadka przy zachowaniu zalecanych dawek**.



* W porównaniu z dotychczas dostępną Aspirin 500 mg (tabletki), zgodnie z ChPL.", M. Voelker, M. Hammer. Dissolution and pharmacokinetics of a novel micronized Aspirin® formulation. Inflammopharmacology. 2012; 20: 225-231.

** Lanas A, McCarthy D, Voelker M, Brueckner A, Senn S, Baron JA. Short-term acetylsalicylic acid (ASPIRIN®) use for pain, fever, or colds – gastrointestinal adverse effects: a meta-analysis of randomized clinical trials. Drugs R D. 1 września 2011 r.;11(3):277-288. McCarthy D.M. Efficacy and gastrointestinal risk of aspirin used for the treatment of pain and cold. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 26 (2012) 101-112

Ważna informacja: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

ASPIRIN® musująca (Acidum acetylsalicylicum), 500 mg, tabletki musujące.

Wskazania: Bóle o lekkim i średnim nasileniu: bóle głowy różnego pochodzenia

(np. migrenowe), bóle zębów, bóle mięśni; ból i gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy.

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500,
www.bayer.com.pl, V8/31.07.2025/MJ

Aspirin PRO (Acidum acetylsalicylicum), 500 mg, tabletki powlekane.

Wskazania: Objawowe leczenie w gorączce i (lub) bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu.

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500,
www.bayer.com.pl, V3/31.07.2025/MJ

Aspirin® C (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum), 400 mg + 240 mg, tabletki musujące.

Aspirin® C Forte (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum), 800 mg + 480 mg, tabletki musujące.

Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (p.: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Aspirin C: dzieci poniżej 12 lat; Aspirin C Forte: dzieci i młodzież.

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500,
www.bayer.com.pl V4/31.07.2025/MJ

Aspirin® (Acidum acetylsalicylicum), 500 mg, tabletki.

Wskazania: Bóle o małym lub umiarkowanym nasileniu, gorączka.

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500,
www.bayer.com.pl, V6/31.07.2025/MJ

Aspirin® (Acidum acetylsalicylicum), 500 mg, tabletki.

Wskazania: Bóle o małym lub umiarkowanym nasileniu, gorączka.

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500,
www.bayer.com.pl, V6/31.07.2025/MJ

ASPIRIN® ANTIGRIP HOT (Acidum acetylsalicylicum + Pseudoephedrini hydrochloridum), 500 mg + 30 mg,

granulat do sporządzania zawiesiny doustnej. Wskazania: Objawowe leczenie obrzęku błony śluzowej nosa i (lub) zatok oraz bólu i gorączki związanych z przeziębieniem i (lub) objawami grypopodobnymi. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, www.bayer.com.pl, V7/29.11.2025/MJ